

WI99 POLVERE DI ROCCIA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Polvere di roccia ad azione corroborante di riequilibrio e rinforzo per piante e terreni, adatta ad ogni tipo di coltivazione e terreno.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Interrare ad una profondità di 40 cm la POLVERE DI ROCCIA WI99 senza involucri di contenimento al centro dell'azienda o dell'appezzamento. Il trattamento si ripete dopo 24 mesi. In caso di terreno con apporto idrico inferiore ai 450mm/anno, si raccomanda l'utilizzo della **POLVERE DI ROCCIA WI97** in sostituzione del WI99.

CONSERVAZIONE: tenere il prodotto sempre all'asciutto e ben imballato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONI: da 70g a 7,5kg a seconda della superficie, come da tabella sottostante.

Per la corretta applicazione nelle specifiche condizioni pedoclimatiche e colturali, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico.

Quantità di POLVERE DI ROCCIA WI99 da interrare:

Apporto Idrico 800-450mm/anno	
Superficie	WI99 (gr)
0,5 ha	70
1 ha	100
2 ha	200
3 ha	250
5 ha	400
7 ha	500
10 ha	600
12 ha	700
15 ha	850
20 ha	1.000
25 ha	1.200
50 ha	2.000
100 ha	3.000
200 ha	5.000
300 ha	7.500

ANALISI MINERALOGICA MEDIA	
QUARZO	20-40%
CALCITE	5-30%
FELDSPATO SODICO	5-35%
FELDSPATO POTASSICO	5-30%
ALTRO	5-20%

ALTRE CARATTERISTICHE	
UMIDITA'	<5%
pH	6,5-7%

è un prodotto
certificato



AVVERTENZE

Come calcolare la parcellizzazione al momento di interrare la POLVERE DI ROCCIA:

- se il campo è attraversato da una **strada asfaltata**, considerare 2 blocchi distinti ciascuno con il suo prodotto interrato,
- se il campo è attraversato da una o più **strade bianche** con larghezza non superiore ai 4-5 metri, considerare come un solo blocco, se larghezza maggiore, allora si considerano 2 blocchi,
- se il campo è attraversato da un **corso d'acqua**, considerare come un solo blocco;
- se il campo è **stretto e lungo**, dividere il prodotto e il campo in 3 parti e interrare il prodotto al centro di ciascuna sub parcella.

*metodo soggetto a licenza da parte di EUREKA coop.

Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del citato DM 18/07/2018, n. 6793 e del DPR 28/02/2012 n. 55.